

OBJETIVO

Establecer medidas de prevención de contagio del virus Sars-Cov-2.

PROCEDIMIENTO SEGURO

Realice desinfección del locker y/o casillero al ingresar a laborar, al retirar los alimentos, cuando guarde los utensilios y al finalizar la jornada laboral.



Evite saludar de mano o beso ni con cualquier segmento corporal.



Siempre estornude o tosa sobre el pliegue del brazo, aun cuando tenga mascarilla facial.

Formas eficaces de mantener el distanciamiento social:



- ▶ **NO** estar en lugares que agrupen gran número de personas.
- ▶ **NO** reunirse para jugar o hablar.
- ▶ **NO** visitar familiares o amigos en sus casas.
- ▶ **NO** compartir alimentos que pasen de mano en mano.
- ▶ **NO** saludar de mano, con besos, abrazos o contacto físico.



Evitar tocarse el rostro, nariz, boca y ojos.

Distancia física



Mantenga la distancia física mínima dos metros.

*En caso de que no pueda conservar esta distancia, tenga en cuenta que el tiempo de acercamiento sea menor a 10 minutos y que cuenten con los EPP de bioseguridad.



Mujeres: Deben usar cachucha o cofia, permanecer con las uñas cortas, preferiblemente sin maquillaje, cabello recogido en forma de dona, si por volumen o largo del cabello se dificulta debe permanecer trenzado.

Hombres: Permanecer con las uñas cortas, preferiblemente sin barba y bigote.



Evite usar accesorios de cualquier tipo, pueden convertirse en foco de infección.



Una vez terminada la labor, todos los elementos de protección personal utilizados durante la jornada deben ser preferiblemente lavados (si son lavables) y/o desinfectados aplicando solución desinfectante y retirando con una toalla desechable:

*Los zapatos o botas: Lave la suela con agua y jabón, aplique solución desinfectante y limpie desde arriba hacia abajo.

*Casco, caretas, gafas de seguridad: Lave con agua y jabón y séquelo, en caso de no ser posible aplique la solución desinfectante y con un paño desechable realice la limpieza iniciando por la parte interna y finalizando por la parte externa.

*Guantes de carnaza o vaqueta: Aplique solución desinfectante y colóquelos a secar.

*Cofia, mascarilla, chaleco, protectores auditivos, guante de nylon: Lave con agua y jabón y colóquelos a secar.



Ante cualquier sintomatología como fiebre, malestar general, lagrimeo nasal, dolor de cabeza debe reportarlo inmediatamente al jefe o supervisor.

Los residuos que se generen por el uso de toallas desechables deberán colocarse en la caneca verde, al terminar realizar lavado de manos.

Antes de guardar en el lockers los EPP, debe realizar desinfección de su casillero.

VERSION	CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
3	Se incluye desinfección del lockers, distancia física y cambio del objetivo del protocolo.	ago-20
2	Cambia el nombre del protocolo, se incluyen medidas preventivas, se eliminan las recomendaciones de ingreso al hogar y se ajustan las medidas de lavado y/o desinfección de EPP.	jul-20
1	Elaboración del documento	abr-20