

**OBJETIVO**

Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de la COVID-19.

**PROCEDIMIENTO SEGURO**

- \* Durante la estadía en los centros de trabajo del Concesionario debe usar obligatoriamente mascarilla facial.
- \* La mascarilla facial lavable debe ser reemplazada cada vez que esté húmeda y/o mínimo cada tres horas.
- \* La mascarilla facial quirúrgica se deberá cambiar mínimo cada tres horas, retirándose de las tiras y depositarse en la bolsa y/o caneca negra del punto ecológico.
- \* No reutilice la mascarilla quirúrgica es un solo uso.
- \* Las mascarillas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos, entre otros, para evitar el riesgo de contaminarse.
- \* Fuera del trabajo, la mascarilla se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en balsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.



Previo al uso de la mascarilla lávese las manos con agua y jabón y/o desinfecte con gel antibacterial. Revise que no presente rasgaduras ni agujeros.




Colóquese en la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Las tiras o banda elástica van a lado y lado de las orejas para mantener la mascarilla en su lugar. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla.



No toque el tapabocas durante su uso. Si por accidente lo hizo, lávese las manos inmediatamente después de su manipulación. Si se humedece reemplácela. Al retirarla doble la mascarilla con la cara externa hacia dentro y deposítela en la bolsa negra y si es lavable en la bolsa que le fue suministrada para posteriormente ser lavada con agua y jabón. Inmediatamente después del retiro de la mascarilla realice lavado de manos con agua y jabón y/o desinfecte con gel antibacterial.

El uso de la mascarilla facial puede causar en algunas personas mareos y ansiedad en un lapsus de hiperventilación, por lo que se recomienda que cuando tenga estos síntomas, ubíquese en un lugar donde se encuentre aislado de otras personas:



Retire la mascarilla sujetándolo de las bandas elásticas o tiras desde atrás hacia adelante. Respire suavemente por 10 segundos para que oxigene el cerebro. Ubique nuevamente la mascarilla que cubra boca, nariz y mentón y lávese o desinfecte las manos.

VERSION	CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
5	Se hacen ajustes de acuerdo a la resolución 223 de 2021.	mar-21
4	Se modifica como se debe realizar el retiro de la mascarilla facial	jul-20
3	Cambia el color de la bolsa y/o caneca para disposición de las mascarillas usadas.	jul-20
2	Se incluye lo referente a que hacer en caso de hiperventilación.	jun-20
1	Elaboración del documento	abr-20